



Cáncer de las trompas de Falopio: Nociones básicas

Las trompas de Falopio son un par de trompas que unen los ovarios al útero. El cáncer de las trompas de Falopio es un cáncer que comienza en las trompas de Falopio. Es causado por las células de las trompas de Falopio que crecen fuera de control. A medida que aumenta el número de células, estas forman un tumor.

Al cáncer de las trompas de Falopio que se ha diseminado desde la las trompas de Falopio hasta otra parte del cuerpo se le denomina [cáncer metastásico](#).

Riesgos

Los riesgos podrían ser:

- Infección o inflamación de las trompas de Falopio.
- No tener hijos.
- No haber usado métodos anticonceptivos.
- Antecedentes familiares de cáncer de las trompas de Falopio.
- Mutaciones genéticas.

Signos de cáncer de las trompas de Falopio

Los signos pueden ser los siguientes:

- Sangrado o secreción vaginal.
- Dolor abdominal.

Diagnóstico del cáncer de las trompas de Falopio

Cuando sus proveedores de atención médica sospechen que puede tener cáncer de las trompas de Falopio, le ordenarán varios exámenes. Entre ellos se encuentran los siguientes:

- Examen pélvico.
- Prueba de Papanicolaou.
- [Ecografía](#).
- Análisis de sangre.

Estas pruebas son importantes, pero una biopsia es la única manera de saber con seguridad si tienes cáncer. Una biopsia:

- Toma una muestra de las trompas de Falopio en busca de células tumorales.
- Se usa para determinar el tipo de cáncer, que tan alterado está [el grado], y si se ha diseminado.

Los resultados se resumen en un informe histopatológico que se envía a su médico, por lo general 5 a 10 días después de la biopsia. Este informe es una parte importante de la planificación de su tratamiento. Puede solicitar una copia del mismo para sus registros.

Estadificación del cáncer de las trompas de Falopio

Para guiar el tratamiento, el cáncer de las trompas de Falopio se “estadifica”;. El estadio depende de lo siguiente:

- El tamaño y la ubicación del tumor.
- La presencia de células tumorales en los ganglios linfáticos.
- La presencia de células tumorales en otras partes del cuerpo.

Los estadios van del estadio I (la mayor parte de los tumores confinados, los más pequeños) al estadio IV (tumores que se han diseminado a otras partes del cuerpo, también denominado cáncer metastásico). Su plan de tratamiento dependerá del estadio y tipo del cáncer de las trompas de Falopio.

Tratamiento

Con frecuencia, se utilizan estos tratamientos:

- Se puede hacer uso de la cirugía para eliminar el cáncer.
- La radiación, el uso de rayos X de alta energía para matar las células cancerosas, se puede usar antes de la cirugía para reducir el tamaño del tumor.
- La quimioterapia, el uso de medicamentos para matar las células cancerosas, se puede administrar después de la cirugía para matar cualquier célula cancerosa que todavía esté en el cuerpo.
- Las terapias dirigidas funcionan contra un determinado objetivo que se encuentra en las células cancerosas. Se le realizarán pruebas para determinados objetivos para decidir si estas terapias son una opción para usted.

Este artículo es una guía básica sobre el cáncer de las trompas de Falopio. Puede obtener más información sobre el cáncer de las trompas de Falopio y su tratamiento en los vínculos a continuación.

[cáncer de trompa de Falopio](#)

[Procedimientos quirúrgicos: Estadificación quirúrgica para la estadificación del cáncer de ovario \(epitelial\), peritoneal primario y de las trompas de Falopio](#)

OncoLink is designed for educational purposes only and is not engaged in rendering medical advice or professional services. The information provided through OncoLink should not be used for diagnosing or treating a health problem or a disease. It is not a substitute for professional care. If you have or suspect you may have a health problem or have questions or concerns about the medication that you have been prescribed, you should consult your health care provider.