



Prevención del embarazo durante el tratamiento del cáncer

Prevenir el embarazo durante el tratamiento contra el cáncer es importante tanto para los hombres como para las mujeres. Si quedara embarazada mientras usted o su pareja estaban recibiendo tratamiento contra el cáncer, podría afectar la salud del bebé.

¿Cómo pueden afectar los tratamientos contra el cáncer al embarazo?

Algunos de los efectos que provocan los tratamientos contra el cáncer son conocidos y otros no. Algunos de los efectos conocidos son:

- Si está embarazada, podría haber un retraso en su tratamiento contra el cáncer, lo que puede provocar que su cáncer empeore.
- Aborto espontáneo.
- Defectos de nacimiento o incluso muerte del feto.
- Crecimiento fetal lento.
- El nacimiento del bebé antes de la fecha prevista (prematureo).
- Mayor riesgo de cáncer infantil para los bebés.

¿Cómo se puede prevenir el embarazo?

Se puede evitar el embarazo durante el tratamiento mediante el uso de anticonceptivos. Algunos medicamentos afectan la eficacia de los anticonceptivos hormonales. Pregúntele a su médico qué tipos de anticonceptivos funcionarán mejor para usted y cuáles son los más eficaces.

Los tipos de anticonceptivos son:

- Control de natalidad permanente
 - Vasectomía: Cirugía para cortar los conductos deferentes masculinos que impiden que los espermatozoides entren en la uretra.
 - Ligadura de trompas: Cirugía para atar o cerrar las trompas de Falopio de una mujer de modo que los espermatozoides y los óvulos no puedan encontrarse y el óvulo no pueda ser fertilizado.
- Abstinencia: No tener relaciones sexuales.
- Métodos no hormonales/de barrera
 - Diafragma/capuchón cervical.
 - Esponja.
 - Espermicida.
 - Condón masculino.
 - Condón femenino.
- Métodos hormonales
 - Implante de progestina que se coloca en el brazo de la mujer.

- Inyecciones de progestina.
- Anticonceptivos orales (píldoras anticonceptivas).
- Parche anticonceptivo para mujeres.
- Anillo vaginal.
- Dispositivos intrauterinos (DIU)
 - Dispositivo intrauterino T de cobre.
 - Sistema intrauterino de levonorgestrel.
- Anticoncepción de emergencia: Se puede utilizar en algunos casos si no se utilizó ningún método anticonceptivo durante la relación sexual o si el método anticonceptivo falló.
 - DIU de cobre.
 - Pastillas anticonceptivas de emergencia.

Si está en edad fértil y está recibiendo tratamiento contra el cáncer, es importante que utilice un método anticonceptivo eficaz. Utilice un método anticonceptivo incluso si ha dejado de tener períodos menstruales, si tiene un recuento bajo de espermatozoides o si su médico le ha dicho que el tratamiento puede provocar infertilidad, ya que eso no está garantizado.

Es posible que su proveedor le sugiera que espere una cierta cantidad de tiempo después de que haya terminado el tratamiento para quedar embarazada o tener un hijo. Hable con su médico sobre cualquier pregunta que tenga. Si desea tener hijos en el futuro, debe hablar con su proveedor sobre [opciones de fertilidad](#).

OncoLink is designed for educational purposes only and is not engaged in rendering medical advice or professional services. The information provided through OncoLink should not be used for diagnosing or treating a health problem or a disease. It is not a substitute for professional care. If you have or suspect you may have a health problem or have questions or concerns about the medication that you have been prescribed, you should consult your health care provider.